Le 18 octobre 1750 Jean guerin âgé
de 16 ans natif de St felix en bazadois fut
Reçu dans L'hopital St andré de Bordeaux pour y
être traité d'une tumeur exostosée qu'il avoit
depuis 12 ans sur La main gauche, Laquelle
occupoit tout Le metacarpe, et La plus grande partie
des doigts. sa grosseur étoit comme celle d'une
grosse rave de périgueux, sa figure d'un rond
un peu triangulaire applati vers sa base; La
peau qui La couvroit, conservoit son integrité
dans toutes ses depressions et inegalités

La Consultation établie dans L'hopital
st andré fut convoquée pour déliberer sur Le
parti qu'il convenoit de prendre en faveur du
malade. Les Sentimens furent partagés entre
L'amputation de L'avant bras et L'extirpation de
L'exostose, fondés sur les difficultés qu'il y avoit
a craindre de ne pouvoir jamais cicatriser
L'ulcere par La grande déperdition de substance,
si Le malade n'étoit encore exposé à de plus grands
accidens de La part des tendons extenseurs adherans,
et peutêtre tout à fait confondus avec Ladite
tumeur. Son peu de mobilité avec douleur ne
confirmoit que trop dans ce Sentiment

Il fut Convenu de Laisser ce traitement
à La prudence du sieur mestivier chirurgien

ARC 41
n° 99

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ordinaire dudit hopital pour qu'il en tirat
Le meilleur parti que faire se pourroit. que si Les
tendons se trouvoient totalement confondus avec
La tumeur sans espoir de pouvoir Les conserver ;
plutôt que Le malade se trouvat exposé à de
plus grands dangers, il passat tout de suite à
L'amputation de L'avant bras.

Le malade préparé par Les remedes
généreaux, Les appareils disposés pour L'une
et L'autre operation, Le sieur mestivier
proceda dabord à celle de La tumeur exostosée
en presence des sieurs Ballay, fellonneau, et
prades ses confreres, qui L'honorerent de Leur
presence. il commença par un incisioncirculaire
à La peau bien au dessus du couronnement de sa
base, à L'endroit ou elle étoit moins mince pour La
conserver en cas de réussite a favoriser La cicatrice.
ayant depouillé toute La tumeur exostosée et
mise à nud, il commença a sier sur son sommet,
pour pouvoir se faire jour du haut en bas. Les
scies, Les élevatoires, ténailles incisives, ciseaux, et
maillet de plomb étoient tous Les instrumens dont
il pouvoit se servir pour faire cette operation. elle
fut d'autant plus Laborieuse qu'il falloit amputer
toute La base de La dite exostose par parcelles,
après avoir sié en differens sens respectivement
aux tendons extenseurs adherans et confondus avec elle.
toute L'attention du sieur mestivier fut de Les –

conserver autant qu'il dépendoit de Lui. tantôt il ecrasoit doucement cette matiere osseuse, Lorsqu'il La trouvoit friable, et propre a être pulverisée; tantôt il Scioit ce qu'il trouvoits extremements dur. on vòioit pleusieurs tendons à nud qu'il faisoit ecarter à mesure qu'il travailloit a en délivrer d'autres.

Enfin L'origine de Ladite exostose, ou de son noyau, si L'on peut parler ainsi, acause de sa naissance et de sa dureté fut Le dernier coup de main qui termina cette operation. La premiere phalange du doigt indicateur, et La partie de L'os du metacarpe qui La soutient, en faisoit Le Lien. cet endroit extrememens dur ne faisoit qu'un même corps. il fallut nécessairement L'amputer au dessus, qui étoit à La partie moyenne de L'os du metacarpe, et Le malade en fut quitte pour La perte d'un seul doigt de cette main, qu'on ne pouvoit absolument Lui conserver.

Toutes Les parties de La tumeure xostosée furent rassamblées à peu près dans Leur premiere forme. Son poids étoit d'une Livre neuf onces. La playe fut pansée comme il convenoit. Le malade fut saigné trois fois dans Les premiers jours: on Lui fit observer un régime convenable: on rapprocha La peau, ou teguments qu'on avoit conservés. à mesure que La playe avancoit en cicatrice, L'os scié se recouvrit sans exfoliation sensible: Les tendons extenseurs en

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

exostose

firent de même, et La playe fut totalement et parfaitements cicatrisée au bout de deux mois avec Liberté des quatre doigts, qu'on Lui avoit heureusement conservé.

Il y a Lieu de croire que La tumeur exostosée dont ce jeune homme étoit attaqué depuis 12 ans venoit de cause externe, puisqu'elle ne causoit point de douleur par elle même, ainsi que toutes celles de cette espece, c'est a dire Les benignes, celles qu'on ne regarde purement que comme un épanchement du suc osseux; comme Lorsque L'exostose arrive à La suite d'une fracture mal reduite, ou par quelque coup, ou chute sur L'os. Les contusions du perioste, son relachements, Le gonflement de L'os en sont toujours Les causes primitives. il est vrai qu'il y a douleur dans Le commencements; mais elle cesse bientôt; il n'y a plus que La grosseur de L'exostose, sa figure, sa situation, et les actions des parties propres aux mouvemens, Lezées, qui déterminents à L'extirpation de ces sortes d'exostoses. Les scrophuleuses, Les veroliques, Les scorbutiques sont plus fâcheuses, et demendents chacune des traitemens particuliers.

Mestivier

Me en chirurgie
a bordeaux

N.o 22.